

# Citisina (N07BA04 – citisinclina)

(Todacitan® 1,5 mg comprimidos EFG, 100 comprimidos) (Coste tratamiento 116,93 euros)

Alcaloide vegetal de estructura similar a la de nicotina, con la que compite en los mismos receptores, desplazándola. Tiene menor capacidad de estimular los receptores nicotínicos. Reduce síntomas de abstinencia.

Ensayos donde muestra superioridad a placebo y no inferior a terapia de reemplazo de nicotina (Walker, N. 2014) y vareniclina (Courtney, RJ. 2021; Walker, N. 2019).

## INDICACIÓN FINANCIADA (BIFIMED 1/2/2023)

Indicado en adultos para el tratamiento de la dependencia tabáquica y reducción de la ansiedad de la dependencia a la nicotina en fumadores que estén dispuestos a dejar de fumar.

## CONDICIONES DE FINANCIACIÓN

Los pacientes deben estar **incluidos en un programa de apoyo** (individual y/o grupal) de deshabituación tabáquica que esté implementado en la CCAA/ INGESA o Mutualidades.

Los pacientes tienen que **cumplir las siguientes características**:

- Motivación expresa de dejar de fumar (constatar con un intento de dejar de fumar en el último año).
- Que fumen 10 cigarrillos o más al día y tengan además, un alto nivel de dependencia calificado por el test de Fagerström > o igual 7.
- Se financiará un intento anual.
- Cada prescripción se realizará por un envase, lo que equivale a 25 días de tratamiento.
- El tratamiento será como máximo hasta 25 días (un envase)
- La dispensación de este medicamento se realizará por el sistema de receta electrónica del SNS.

## POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Días de tratamiento	Dosis recomendada	Dosis diaria máxima	Dejar de fumar a más tardar el <b>5º día de tratamiento</b> .
Del 1.º al 3.º día	1 comp. cada 2 h.	6 comprimidos	Seguir fumando durante el tratamiento <b>podría empeorar reacciones adversas</b> .  En caso de fracaso de tratamiento, este debe interrumpirse y podrá reanudarse en 2-3 meses.
Del 4.º al 12.º día	1 comp. cada 2,5 h.	5 comprimidos	
Del 13.º al 16.º día	1 comp. cada 3 h.	4 comprimidos	
Del 17.º al 20.º día	1 comp. cada 5 h.	3 comprimidos	
Del 21.º al 25.º día	1-2 comp. al día	Hasta 2 comprimidos	

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD



**Evitar** en insuficiencia renal o hepática (no experiencia clínica)

> **65**

**Evitar** en >65 y <18 años (escasa experiencia)



Fumar o usar productos con **nicotina** simultáneamente puede provocar reacciones adversas a la nicotina más graves



Evitar con fármacos antituberculosos. Puede reducir eficacia de anticonceptivos.

## CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a principio activo o excipientes  
Angina inestable  
Antecedentes de IAM reciente  
Arritmias con relevancia clínica  
Antecedente reciente de ACV  
Embarazo y lactancia

## REACCIONES ADVERSAS Más FRECUENTES

Tracto gastrointestinal (más al inicio)  
Boca seca, alteración del gusto  
Cambios de apetito y aumento de peso  
Mareos, cefaleas, mialgias, astenia  
Trastornos de frecuencia cardíaca, hipertensión  
Cambios de humor, trastornos del sueño